

悪性リンパ腫

- リツキシマブ単独療法

1週間（リツキシマブを Day1）を1コースとして休薬期間は特に設けない。最大8コースまで投与を繰り返す。

- CHOP療法

1週間（シクロホスファミド、ドキシソルビシン、ビンクリスチンを Day1、プレドニゾロンの経口投与を Day1～5）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。完全寛解になるまで6～8コース投与を繰り返す。

- R-CHOP療法

1週間（リツキシマブを Day1、シクロホスファミド、ドキシソルビシン、ビンクリスチンを Day2、プレドニゾロンの経口投与を Day2～6）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。完全寛解になるまで6～8コース投与を繰り返す。

- ベンダムスチン単独療法

1週間（ベンダムスチンを Day1～2）投与し、3週間休薬する。これ（4週間）を1コースとして6コース投与を繰り返す。

- リツキシマブ + ベンダムスチン療法

1週間（リツキシマブBSを Day1、ベンダムスチンを Day1～2）投与し、3週間休薬する。これ（4週間）を1コースとして6コース投与を繰り返す。

- オビヌツズマブ + ベンダムスチン療法

1週間（オビヌツズマブを Day1、ベンダムスチンを Day2～3）投与後、3週間休薬する。これ（4週間）を1コースとして6コース投与を繰り返す。

- オビヌツズマブ単独療法

オビヌツズマブ + ベンダムスチン療法後の維持療法として、オビヌツズマブを2カ月毎に2年間投与する。

- THP-COP療法

1週間（シクロホスファミド、ピラルビシン、ビンクリスチンを Day1、プレドニゾロンの経口投与を Day1～5）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。完全寛解になるまで6～8コース投与を繰り返す。

- R-THP-COP療法

1週間(リツキシマブを Day1、シクロホスファミド、ピラルビシン、ビンクリスチンを Day2、プレドニゾロンの経口投与を Day2~6) 投与し、2週間休薬する。これ(3週間)を1コースとして投与を繰り返す。完全寛解になるまで6~8コース投与を繰り返す。

- EPOCH療法

1週間(エトポシド、ビンクリスチン、ドキソルビシンを Day1~4、シクロホスファミドを Day5、プレドニゾロンの経口投与を Day1~5) 投与し、2週間休薬する。これ(3週間)を1コースとして6コース投与を繰り返す。

- ICE療法

1週間(エトポシドを Day1~3、イホスファミドを Day2、カルボプラチンを Day2) 投与し、2週間休薬する。これ(3週間)を1コースとして投与を繰り返す。

- DeVIC療法

1週間(カルボプラチンを Day1、エトポシドを Day1~3、イホスファミドを Day1~3、メスナを Day1~3、デキサメサゾン を Day1~3) 投与し、2週間休薬する。これ(3週間)を1コースとして3コース投与を繰り返す。

- (R-)MPV療法

2週間(メトトレキサート、ビンクリスチンを Day1、プロカルバジン を奇数サイクルの Day1~7、ホリナートカルシウムを Day1~4) 投与を1コースとして最大5サイクル投与を繰り返す。事前にリツキシマブの投与を行う(別レジメン)。

- MTX・LV救援療法

1週間(メトトレキサートを Day1、ホリナートカルシウムを Day1~4) 投与し、1~3週間休薬する。これ(2~4週間)を1コースとして最大8コースまで投与を繰り返す。

- HD-MTX + Ara-C療法

3週間(メトトレキサートを Day1、シタラビンを Day2~3、mPSLを Day1~3、ホリナートカルシウムを Day1~4) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- ブレンツキシマブベドチン単独療法

1週間(ブレンツキシマブベドチンを Day1) 投与し、2週間休薬する。これ(3週間)を1コースとして投与を繰り返す。

- $^{111}\text{In} \cdot ^{90}\text{Y}$ 前処置リツキシマブ療法 【RI 標識抗体療法】

リツキシマブを Day1 と Day8 に投与する。

Day1:リツキシマブ投与終了後 4 時間以内にインジウム イブリツモマブを投与する。

Day8:リツキシマブ投与終了後 4 時間以内にイットリウム イブリツモマブを投与する。

- A B V D療法

3 週間（ドキソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン）を Day1, 15)

投与し、1 週間休薬する。これ（4 週間）を 1 コースとして 6 コース投与を繰り返す。