

## 大腸がん

- FOLFIRI療法

2週間（レボホリナート、イリノテカンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- mFOLFOX6療法

2週間（レボホリナート、オキサリプラチンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- FOLFIRI + Bev療法

2週間（ペバシズマブ、レボホリナート、イリノテカンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- mFOLFOX6 + Bev療法

2週間（ペバシズマブ、レボホリナート、オキサリプラチンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- FOLFIRI + P-mab療法

2週間（パニツムマブ、レボホリナート、イリノテカンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- mFOLFOX6 + P-mab療法

2週間（パニツムマブ、レボホリナート、オキサリプラチンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- FOLFIRI + C-mab療法

・2週間（レボホリナート、イリノテカンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2、セツキシマブスを Day1, 8) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- mFOLFOX6 + C-mab療法

2週間（レボホリナート、オキサリプラチンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2、セツキシマブスを Day1, 8) 投与を1コースとして投与を繰り返す。

- FOLFIRI + RAM療法

2週間（ラムシルマブ、レボホリナート、イリノテカンを Day1、フルオロウラシルの持続

点滴を Day1, 2) 投与を 1 コースとして投与を繰り返す。

- FOLFIRI + AFL療法

2週間（アフリベルセプト、レボホリナート、イリノテカンを Day1、フルオロウラシルの持続点滴を Day1, 2) 投与を 1 コースとして投与を繰り返す。

- XELOX療法

2週間（カペシタビンを Day1~14、オキサリプラチンを Day1) 投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- XELIRI療法

2週間（カペシタビンを Day1~14、イリノテカンを Day1) 投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- SOX療法

2週間（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤を Day1~14、オキサリプラチンを Day1) 投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- IRIS療法

3週間（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤を Day1~14、イリノテカンを Day1, 15) 投与し、1週間休薬する。これ（4週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- XELOX + Bev療法

2週間（カペシタビンを Day1~14、ベバシズマブ、オキサリプラチンを Day1) 投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- XELIRI + Bev療法

2週間（カペシタビンを Day1~14、ベバシズマブ、イリノテカンを Day1) 投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- SOX + Bev療法

2週間（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤を Day1~14、ベバシズマブ、オキサリプラチンを Day1) 投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- IRIS + Bev療法

3週間(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤を Day1~14、ベバシズマブ、イリノテカンを Day1, 15) 投与し、1週間休薬する。これ(4週間)を1コースとして投与を繰り返す。

● CPT-11 + C-mab療法

6週間(セツキシマブを Day1, 8, 15, 22, 29, 36、イリノテカンを Day1, 8, 15, 22) 投与を1コースとして投与を繰り返す。