

## 食道がん

- F P (CDDP + 5-FU) 療法

1週間(シスプラチンを Day1、フルオロウラシルを Day1~5)投与し、3週間休薬する。  
これ(4週間)を1コースとして投与を繰り返す。

- F P (CDDP + 5-FU) 療法 放射線化学療法

・1週間(シスプラチンを Day1、フルオロウラシルを Day1~4)投与し、3週間休薬する。  
これ(4週間)を1コースとして2コース投与を繰り返す。

- F P (CDDP + 5-FU) 療法 術前補助化学療法

1週間(シスプラチンを Day1、フルオロウラシルを Day1~5)投与し、2週間休薬する。  
これ(3週間)を1コースとして術前に2コース施行する。

- NDP + 5-FU併用療法

1週間(ネダプラチンを Day1、フルオロウラシルを Day1~5)投与し、3週間休薬する。  
これ(4週間)を1コースとして投与を繰り返す。

- DCF療法

1週間(ドセタキセル、シスプラチンを Day1、フルオロウラシルを Day1~5)投与し、3週間休薬する。これ(4週間)を1コースとして投与を繰り返す。

- DTX単独療法

1週間(ドセタキセルを Day1)投与し、2~3週間休薬する。これ(3~4週間)を1コースとして投与を繰り返す。